

# Rubus adenacanthus Troelstra, Meijer & A. Beek

## Haselblattbrombeere

*Bestimmungsrelevante Merkmale:*

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> rundlich-stumpfkantig</li> <li>- <b>Behaarung:</b> (fast) kahl</li> <li>- <b>Stieldrüsen:</b> Drüsenstacheln</li> <li>- <b>Stacheln:</b> (8-)15-25(-&gt;50 auf 5 cm, bald verschmälert, zusammengedrückt, z.T. mit Drüsenköpfchen)</li> </ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Blättchenanzahl:</b> fußförmig (4-)5-zählig</li> <li>- <b>Behaarung:</b> oberseits etwas behaart, unterseits ziemlich dicht und etwas kammartig behaart</li> <li>- <b>Endblättchen:</b> eiförmig oder fast kreisrund mit kurzer Spitze</li> <li>- <b>Serratur:</b> seicht und meist weit</li> <li>- <b>Blattstiel:</b> mit (8-)10-20(-22) etwas geneigten oder schwach gebogenen ungleichen Stacheln</li> </ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> unregelmäßig</li> <li>- <b>Blätter:</b></li> <li>- <b>Achse:</b> dichtstachlig; Stacheln blass gelb oder mit roter Basis, unterschiedlich in Dichte und Länge, geneigt oder schwach gekrümmt, z. T. mit Drüsenköpfchen</li> <li>- <b>Blütenstiele:</b> mit 3-15 Stacheln</li> <li>- <b>Kelch:</b> grau mit weißem Rand, mit unterschiedlich zahlreichen Stacheln, Drüsen und Drüsenborsten</li> <li>- <b>Kronblätter:</b> weiß oder blassrosa</li> <li>- <b>Staubblätter:</b> Antheren behaart</li> <li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl oder mit einzelnen Haaren; Griffel grünlich oder am Grunde rötlich</li> </ul>

**Verbreitung:** Regionalsippe der östlichen Niederlande (Gelderland, Overijssel, selten in Flevoland); Ein Fund in Deutschland (Neudersum); außerdem sind z. B. im Emsland oder bei Bad Bentheim weitere Funde zu erwarten.