

Rubus asperidens Sudre ex Bouvet

Rauzähnige Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

| | |
|--------------------|---|
| Schössling | <ul style="list-style-type: none"> - Form: kantig, oft etwas bereift - Behaarung: zerstreut bis mäßig dicht - Stieldrüsen: meist zahlreich - Stacheln: größere zu 6→10 pro 5 cm, schwach bis mäßig geneigt, gerade oder etwas gebogen, 4-7 mm lang, dazwischen zahlreiche Stachelchen, Stachel- und Drüsenborsten |
| Blätter | <ul style="list-style-type: none"> - Blättchenanzahl: 5-zählig - Behaarung: oberseits hellgrün, mit 20-40 Haaren pro cm², unterseits (grau-)grün, mit wenig fühlbaren Haaren - Endblättchen: schmal (verkehrt) eiförmig oder elliptisch, mit bis 20 mm langer Spitze - Serratur: fein bis ziemlich grob - Blattstiel: drüsig, mit 10-15 Stacheln |
| Blütenstand | <ul style="list-style-type: none"> - Form: zylindrisch oder pyramidal - Blätter: hochblättrig - Achse: behaart und drüsig, größere Stacheln zu 3-7 - Blütenstiele: mit zahlreichen zarten Stieldrüsen, Stacheln nadelig - Kelch: dicht behaart, stieldrüsig und bestachelt, locker zurückgebogen - Kronblätter: weiß - Staubblätter: viel länger als die am Grund manchmal rötlichen Griffel, Antheren kahl - Fruchtknoten: dicht behaart |

Ähnliche Taxa: *R. euryanthemus* (kürzere Drüsen und weniger ungleiche Stacheln)

Verbreitung: Vom äußersten W-Nordrhein-Westfalen über die Niederlande (hier nur ein Einzelvorkommen), Belgien und die Bretagne durch S-England (Hauptverbreitung) bis in den Osten Irlands.