

Rubus asperidens (Sudre ex Bouvet) R.Keller

Rauzähnige Brombeere


Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none">- Form: kantig, oft etwas bereift- Behaarung: zerstreut bis mäßig dicht- Stieldrüsen: meist zahlreich- Stacheln: größere zu 6→10 pro 5 cm, schwach bis mäßig geneigt, gerade oder etwas gebogen, 4-7 mm lang, dazwischen zahlreiche Stachelchen, Stachel- und Drüsenborsten
Blätter	<ul style="list-style-type: none">- Blättchenanzahl: 5-zählig- Behaarung: oberseits hellgrün, mit 20-40 Haaren pro cm², unterseits (grau-)grün, mit wenig fühlbaren Haaren- Endblättchen: schmal (verkehrt) eiförmig oder elliptisch, mit bis 20 mm langer Spitze- Serratur: fein bis ziemlich grob- Blattstiel: drüsig, mit 10-15 Stacheln
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none">- Form: zylindrisch oder pyramidal- Blätter: hochblättrig- Achse: behaart und drüsig, größere Stacheln zu 3-7- Blütenstiele: mit zahlreichen zarten Stieldrüsen, Stacheln nadelig- Kelch: dicht behaart, stieldrüsig und bestachelt, locker zurückgebogen- Kronblätter: weiß- Staubblätter: viel länger als die am Grund manchmal rötlichen Griffel, Antheren kahl- Fruchtknoten: dicht behaart

Ähnliche Taxa: *R. euryanthemus* (kürzere Drüsen und weniger ungleiche Stacheln)

Ökologie: Vorwiegend nemophile Sippe frischer, nährstoffreicherer, aber meist entkalkter, humoser (Löß-)Lehmböden.

Verbreitung: Vom äußersten W-Nordrhein-Westfalen über die Niederlande (hier nur ein Einzelvorkommen), Belgien und die Bretagne durch S-England (Hauptverbreitung) bis in den Osten Irlands.



Rubus asperidens



Blütenstand



Blütenstandsachse



Blüte



Blüte seitlich