

# Rubus brdensis Holub

## Brdy-Brombeere

### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> niedrig-bogig bis kriechend</li><li>- <b>Behaarung:</b> spärlich behaart</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> keine</li><li>- <b>Stacheln:</b> Stacheln, Borsten und Drüsenhaare in unterschiedlichen Größen und Formen</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> ausschließlich 3-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> unterseits kahl bis spärlich behaart, daher grün und kaum fühlbar behaart</li><li>- <b>Endblättchen:</b> ptisch bis verkehrt-eiförmig mit einer undeutlichen, 5-10 mm langen Spitze</li><li>- <b>Serratur:</b> periodisch, ± regelmäßig, gekerbt, nur 1-2 mm tief</li><li>- <b>Blattstiel:</b></li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> kurz, armbütig</li><li>- <b>Blätter:</b></li><li>- <b>Achse:</b> mit geraden oder leicht gebogenen Stacheln</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> mit dunkelroten Stieldrüsen</li><li>- <b>Kelch:</b></li><li>- <b>Kronblätter:</b> rosa</li><li>- <b>Staubblätter:</b> Staubfäden schwachrosa, Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl</li></ul>

**Ähnliche Taxa:** *R. koehleri* (Schösslingsblätter 5-zählig), *R. apricus* (Schösslingsblätter 5-zählig), *R. bavaricus* (Schösslingsblätter 3- bis 5zählig, unterseits weiß-/graufilzig)

**Ökologie und Soziologie:** nemophil; Fichtenforste, Lichtungen, Wald- und Forststraßenränder; submontan

**Verbreitung:** In Deutschland bisher nur ein Einzelnachweis im Bayerischen Wald bei Bayrisch-Eisenstein; Hauptvorkommen in Böhmen.