

Rubus calyculatus Kaltenb.

Langkelchige Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none"> - Form: - Behaarung: mit >20 Haaren pro cm - Stieldrüsen: , 20-75 pro 5 cm - Stacheln: größere zu 12-30 pro 5 cm, dünn, 4-6 mm lang; außerdem 7-25 kleine Stachelchen pro 5 cm
Blätter	<ul style="list-style-type: none"> - Blättchenanzahl: hand- bis ausgeprägt fußförmig, 5zählig - Behaarung: oberseits kahl, dunkelgrün, unterseits grün, mit wenigen Haaren - Endblättchen: ziemlich kurz gestielt, aus herzförmigem bis ausgerandetem Grund elliptisch, in eine lange Spitze verschmälert - Serratur: ziemlich grob - Seitenblättchen: untere 7-12 mm gestielt - Blattstiel: dicht stieldrüsig, mit 20-30 stark geneigten oder krummen Stacheln
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none"> - Form: lang und schmal pyramidal - Blätter: meistens bis oben durchblättert - Achse: mit zahlreichen Stieldrüsen, größere Stacheln zu 7-15 pro 5 cm, fast nadelig oder zusammengedrückt, stark geneigt, oft gebogen, 2-4 mm lang - Blütenstiele: dunkel graugrün, mit 2->100 Stieldrüsen und 2-45 Stacheln - Kelch: sehr lang, oft blattartig zugespitzt, mit 5->50 Stieldrüsen und 0-16 Stacheln, locker zurückgeschlagen - Kronblätter: weiß - Staubblätter: die grünen Griffel überragend; Antheren kahl - Fruchtknoten: (fast) kahl

Ähnliche Taxa: : *R. carduelis* (Schössling dichter bestachelt, Blätter kürzer gestielt)

Verbreitung: Regionalsippe, in Deutschland selten in der N-Eifel; außerdem S-Niederlande nördlich von Aachen sowie O-Belgien.