

## Rubus conspicuus P. J. Müller ex Wirtgen Ansehnliche Brombeere

Ähnlich *Rubus vestitus*, unterscheidet sich von diesem in folgenden Merkmalen:

	<b>R. conspicuus</b>	<b>R. vestitus</b>
<b>Schössling</b>		
- Behaarung	überwiegend fein büschelhaarig	20-100 Haare pro cm Seite
- Stieldrüsen	meist zahlreicher	0-20 Stieldrüsen pro cm Seite
- Stacheln	ungleich, teilweise leicht gekrümmt	bis 7-8(-10) mm lang, gerade
<b>Blätter</b>		
- Blättchenanzahl	4- bis fußförmig 5-zählig	fußförmig bis handförmig 5-zählig, einzelne auch 4-zählig
- Behaarung	oberseits mit 1-10 Haaren pro cm <sup>2</sup> , unterseits angedrückt ± graufilzig, oft ohne oder mit nur geringer schimmernder Behaarung	oberseits meist 5-30 Haare pro cm <sup>2</sup> ; unterseits graugrün bis grauweiß filzig und dazu von schimmernden Haaren samtig weich
- Endblättchen	kürzer gestielt (25-33 % der Spreite), schmaler umgekehrt eiförmig, nie kreisrund	mäßig lang bis lang gestielt (35-50%), fast kreisrund mit größter Breite oberhalb der Mitte
- Serratur	grober mit stark auswärts gekrümmten, längeren Hauptzähnen 2,5-3,5 mm tief gesägt	periodisch mit auswärts gekrümmten, gleichlangen oder etwas längeren Hauptzähnen
<b>Blütenstand</b>		
- Blütenstandsachse	filzig angedrückt behaart; mit teilweise etwas gekrümmten Stacheln; Stieldrüsen teilweise bis 1,5 mm lang	dicht filzig und abstehend zottig behaart; Stacheln alle oder fast alle gerade; mit 10->100 Stieldrüsen
- Kelch	stärker bestachelt	mit einzelnen Stachelchen
- Kronblätter	stets rosa	rosarot oder weiß
- Staubblätter	Antheren kahl	Antheren kahl oder behaart
- Fruchtknoten	(fast) kahl ; Griffelbasis stets rosa	reichlich behaart; Griffelbasis weißlich oder rötlich