

Rubus dechenii Wirtgen **Dechens Brombeere**

Ähnlich *R. eifeliensis*. *R. dechenii* und *R. eifeliensis* unterscheiden sich in folgenden Merkmalen:

	dechenii	eifeliensis
Blätter		
- Blättchenanzahl	deutlich fußförmig 4-5-zählig	fußförmig 5-zählig
- Behaarung	oberseits fast kahl, unterseits ohne Sternhärchen	oberseits mit 5-20 Haaren pro cm ² , unterseits schimmernd samtig weichhaarig
- Endblättchen	Spitze mehr abgesetzt und länger (etwa 10-15 mm lang)	mit etwas abgesetzter, etwa 10 mm langer Spitze
Blütenstand		
- Blütenstiele	nur mit kurzer, mehr filziger Behaarung; Stacheln 6-15, etwa 2 mm lang, leicht gekrümmt	filzig-wirrhaarig und dazu dicht bis fast 1,5 mm abstehend zottig; Stacheln 2-7, etwa 1-2,5 mm lang, (fast) gerade
- Kronblätter	weiß	porzellanartig weiß mit rosa Schimmer
- Fruchtknoten	Griffel zuweilen an der Basis etwas rosa	Griffel grünlich

Verbreitung: Regionalsippe in der Eifel und in Luxemburg. In Rheinland-Pfalz in der Eifel lokal häufig nordwärts etwa bis zur Linie Wittlich - Gerolstein - Münstermaifeld, darüber hinaus nördlich ein Fundort bei Neuerburg.