

Rubus erinulus A. Beek
Igel-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: - Behaarung: kahl - Stieldrüsen: keine - Stacheln: (15-)25-70 pro 5 cm, dünn, geneigt und (meist) gerade, 3-6 mm lang, meist auffallend karminrot
Blätter	- Blättchenanzahl: 3-zählig - Behaarung: oberseits mit 10-30 Haaren pro cm², unterseits grün, dicht kurzhaarig bis fast kahl, ohne Filz - Endblättchen: ziemlich kurz gestielt, aus ausgebuchtetem oder gerundetem, selten etwas keiligem Grund breit eirundlich bis fast kreisrund, mit plötzlich aufgesetzter kurzer Spitze - Serratur: periodisch, mit (stark) auswärts gekrümmten Hauptzähnen - Blattstiel: mit 14-27 dünnen Stacheln und 0-20 (Drüsen-)Borsten
Blütenstand	- Form: kurz pyramidal, Gesamteindruck grün (nicht gräulich wie bei <i>R. egregius</i>) - Blätter: - Achse: fast kahl bis schwach, nach oben zunehmend behaart, mit 0-5 kurzen Stieldrüsen und 20-35 fast nadeligen, nur 3-5 mm langen Stacheln pro 5 cm - Blütenstiele: mit 0-10 Stieldrüsen, dicht bestachelt - Kelch: mit 0-3 Stacheln, abstehend oder schwach zurückgeschlagen - Kronblätter: weiß, kurz genagelt - Staubblätter: Antheren kahl - Fruchtknoten: kahl

Ähnliche Taxa: *R. egregius*

Ökologie und Soziologie: Humusreiche Wälder auf saurem Grund

Verbreitung: Regionalsippe in NO-Niederlande (vor allem Drenthe und Friesland sowie umliegende Provinzen); Funde im Emsland auf deutscher Seite sind möglich