

## Rubus illecebrosus Focke Japanische Himbeere

### *Bestimmungsrelevante Merkmale:*

<b>Schössling</b>	- <b>Form:</b> 50-100 cm hoch, mit Ausläufern, im Winter einziehend; nicht bereift - <b>Stacheln:</b> spärlich bestachelt, Stacheln 3-4 mm lang, mit breiter Basis
<b>Blätter</b>	- <b>Blättchenanzahl:</b> (3-) 5-7-zählig gefiedert, nicht drüsig, unterseits mit kleinen Stacheln auf den Adern - <b>Endblättchen:</b> Blättchen lanzettlich bis schmal eiförmig (das endständige 6,2-8,5 × 2,2-3 cm) - <b>Serratur:</b> Blattrand fein doppelt gezähnt
<b>Blütenstand</b>	- <b>Form:</b> 1-3blütig - <b>Kronblätter:</b> weiß, breit oval, 12 –15(18) mm - <b>Fruchtknoten:</b> Sammelfrucht eiförmig, 14-20 mm, mit 50-100 sehr kleinen Teilfrüchten, leuchtend rosa- bis scharlachrot

**Ökologie und Soziologie:** Seltene Zier- und Kulturpflanze; Säume, Gebüschränder, auf humosen Böden

**Verbreitung:** In Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz lokal verwildert. (Heimat: Ostasien.)