

Rubus negatus A. Beek
Verleugnete Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: kantig - Behaarung: dicht behaart - Stieldrüsen: 60-250 - Stacheln: 5-30 pro 5 cm, dünn nadelig, 1-4 mm lang
Blätter	- Blättchenanzahl: (3-) fußförmig 5-zählig - Behaarung: oberseits wenig behaart, unterseits auf den Nerven spärlich, nicht fühlbar behaart - Endblättchen: kurz gestielt, aus herzförmiger Basis eirundlich bis etwas umgekehrt eirundlich; Serratur meistens fein, sehr flach mit etwas auswärts gekrümmten Hauptzähnen - Serratur: meistens fein, sehr flach mit etwas auswärts gekrümmten Hauptzähnen - Blattstiel: mit dichten Stieldrüsen(-Borsten) und feinen Nadelstacheln
Blütenstand	- Form: zylindrisch oder pyramidal - Blätter: groß - Achse: dichthaarig, mit zahlreichen ungleichen Drüsenborsten und nadeligen Stacheln - Blütenstiele: mit dichtstehenden Stieldrüsen und feinen Nadelstachelchen - Kelch: (grün-)graulich, mit (Drüsen-)Borsten und Stachelchen, zuerst zurückgeschlagen, später locker abstehend - Kronblätter: weiß, sehr schmal - Staubblätter: Antheren kahl - Fruchtknoten: kahl oder zuerst etwas behaart

Ökologie und Soziologie: alte Wälder, Waldränder, oft auf sandigem Grund

Verbreitung: Regionalsippe der Provinz Drenthe in NO-Niederlande, in Deutschland nur randlich am Niederrhein.