

Rubus nelliae A. Beek

Nelli-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none"> - Form: hochbogig oder sehr hoch kletternd - Behaarung: mäßig behaart, streckenweise kahl - Stieldrüsen: keine - Stacheln: 4-6 mm lang, dick pfriemlich oder zusammengedrückt, gerade, gekrümmt oder mit hakiger Spitze, zu 3-11 pro 5 cm
Blätter	<ul style="list-style-type: none"> - Blättchenanzahl: (4-)5-zählig - Behaarung: oberseits kahl oder mit vereinzelt Haaren, unterseits graufilzig mit langen Haaren - Endblättchen: eirundlich, elliptisch oder fast kreisrund mit herzförmigem bis gerundetem Grund und kurzer Spitze - Serratur: periodisch, unregelmäßig, ziemlich fein, mit langen, verschieden ausgerichteten Zähnen - Blattstiel: mit 12-25 rückwärts gerichteten bis krummen Stacheln, dazu mitunter mit einzelnen kleinen Stachelchen und 0-4 Stieldrüsen
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none"> - Form: locker pyramidal - Blätter: hoch durchblättert - Achse: wenig bis mäßig dicht behaart, Stacheln 4-9 pro 5 cm, rückwärts gerichtet, mitunter gekrümmt bis hakig, 2-6 mm lang - Blütenstiele: mit 1-12 Stacheln, mitunter mit einzelnen Stieldrüsen - Kelch: mit 0-5 Stacheln und 0-9 kurzen Stieldrüsen, zurückgeschlagen oder etwas abstehend - Kronblätter: weiß, 8--11 mm lang - Staubblätter: länger als die grünlichen Griffel, Antheren kahl - Fruchtknoten: kahl

Ökologie und Soziologie: Hecken auf sandigem Grund

Verbreitung: Regionalsippe der Niederlande (um Wageningen/Overijssel, auch in Drenthe). Ähnliche Pflanzen, deren Identität noch bestätigt werden muss, kommen in NW-Deutschland und Frankreich vor.