

(nach H.E. Weber in: Illustr. Flora von Mitteleuropa, Berlin 1995, S. 444f.)

## **Rubus oblongifolius P.J. Müller et Wirtgen** **Verlängertblättrige Brombeere**

Ähnlich *Rubus guestphalicus*, unterscheidet sich von diesem durch folgende Merkmale:

	<b>oblongifolius</b>	<b>guestphalicus</b>
<b>Schössling</b>		
- Stieldrüsen	dicht stieldrüsig	pro 5 cm mit 1-3(20) Stieldrüsen
- Stacheln	6(-7) mm lang, sehr dünn	4-5 mm lang, schlank
<b>Blätter</b>		
- Blättchenanzahl	vereinzelt auch 4-5-zählig	alle 3-zählig
- Behaarung	oberseits mit etwa 20-30 Haaren pro cm <sup>2</sup> , unterseits oft dünn filzig	oberseits mit mehr als 50 Haaren pro cm <sup>2</sup> , unterseits filzlos grün
Endblättchen	am Grunde oft etwas herzförmig, verlängert verkehrt eiförmig, mit mehr abgesetzter Spitze	aus schmal abgerundeter Basis schmal umgekehrt eiförmig bis etwas rhombisch, allmählich 15-20 mm lang bespitzt
<b>Blütenstand</b>		
- Blütenstiele	mit zahlreichen dunklen, die Behaarung überragenden Stieldrüsen	meist nur mit 2-6 Stieldrüsen

**Verbreitung:** Regionalart in Rheinland-Pfalz. Außerdem ein Fundort im Saarland bei Dillingen und mehrfach in Luxemburg.