Rubus odoratus L.
Zimt - Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- **Form**: Strauch mit ca. 1-2(-3) m hohen mehrjährigen aufrechten Stämmen; diese mit abblätternder Rinde; Schössling rund - **Behaarung:** lang behaart - **Stieldrüsen**: zahlreich - **Stacheln**: keine
Blätter	- **Blättchenanzahl**: aus herzförmigem Grund breit 5-lappig mit ± spitz dreieckigen Lappen; Blatt 8-25 (-30) cm im Ø - **Behaarung**: beiderseits grün und behaart - **Endblättchen**: Blatt ungeteilt, nur gelappt - **Serratur**: ungleich gesägt - **Seitenblättchen**: Blatt ungeteilt, nur gelappt - **Blattstiel**: dicht stieldrüsig
Blütenstand	- **Form**: doldentraubig - **Blätter:** ohne - **Achse**: behaart, reichlich stieldrüsig - **Blütenstiele**: dicht stieldrüsig - **Kelch**: 5-zählig, dicht mit Stieldrüsen besetzt; mit langen Anhängseln - **Kronblätter**: purpurrosa(rot), wohlriechend, groß - **Staubblätter**: Antheren kahl - **Fruchtknoten**: Sammelfrucht orange

Kurzcharakteristik: *R. odoratus* ist ein eher johannisbeerartiger Strauch und wird als Zierpflanze gelegentlich in Gärten und Anlagen kultiviert.

Ähnliche Taxa: In Gärten wird gelegentlich (mit ähnlichen roten Blüten, doch 3-zähligen Blättern) der Bastard *R. odoratus x idaeus* (*R. x nobilis* REGEL) gezogen.

Ökologie und Soziologie:

Verbreitung: Heimat: Nordamerika. Selten verwildert beobachtet. Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen keine Fundangaben vor.



Rubus odoratus

Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen für *Rubus odoratus* keine Fundangaben vor.





Rubus odoratus

Pflanze

Blütenstiel

Blüte

Blütenkelch