

Rubus passionis A. Beek & Meijer

Langstachelige Purpurbrombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: (stumpf-)kantig - Behaarung: (fast) kahl - Stieldrüsen: zu 5-100 pro 5 cm - Stacheln: 8-50 pro 5 cm, dunkelbraun-violett, oft zusammengedrückt, 4-6 mm lang
Blätter	- Blättchenanzahl: 3-5-zählig - Behaarung: oberseits meist hellgrün, fast kahl bis leicht behaart, unterseits ziemlich dicht kurz sanfthaarig, ohne Filz - Endblättchen: fast kreisrund mit herzförmigem Grund, ohne Neigung zu Teilung, plötzlich zugespitzt - Serratur: fein, gleichmäßig, mit z.T. auswärts gerichteten Zähnen - Blattstiel: mit 2-10 derben, geneigten oder gebogenen Stacheln
Blütenstand	- Form: locker, unregelmäßig - Blätter: - Achse: etwas behaart, Stacheln 1-13 pro 5 cm, nadelförmig, 2-5 mm lang, mit Übergängen zu den 2-75 Stieldrüsen pro 5 cm - Blütenstiele: filzig behaart, mit 10->100 purpurnen Stieldrüsen und 0-7 (Drüsen-)Stacheln - Kelch: zurückgeschlagen bis aufrecht, bewehrt - Kronblätter: weiß - Staubblätter: Antheren kahl - Fruchtknoten: kahl oder mit einem einzelnen Haar

Ähnliche Taxa: nur *R. phoenicacanthus* und *R. coccinatus*

Verbreitung: Regionalsippe in den Niederlanden (Drenthe, Friesland, Overijssel). Vorkommen z. B. im Emsland auf deutscher Seite sind möglich.