

Rubus pseudoinfestus H. E Weber

Falsche Feindliche Brombeere

)

Differentialmerkmale: (aus H.E. Weber in: carolina, 47, 1989, S. 50)

Rubus infestus unterscheidet sich von *A. pseudoinfestus* vor allem durch folgende Merkmale:

- Schössling (fast) kahl, mit zerstreuteren Stieldrüsen und breiteren, teilweise deutlich gekrümmten, 7-9 mm langen Stacheln
- Blätter 4-5-zählig, oberseits mit 10-30 Haaren pro cm², unterseits ± filzig
- Endblättchen länger gestielt (Stielchenlänge = 33-45 % der Spreitenlänge), am Grunde etwas herzförmig, gleichmäßiger gesägt
- untere Blättchen bis 4 mm lang gestielt
- Blütenstand mit schwächer behaarter Achse und mit sehr breiten, teilweise fast hakig gekrümmten, bis 6-7(-9) mm langen Stacheln
- Endblättchen der Blütenstandsblätter am Grunde breiter abgerundet bis etwas herzförmig
- Blütenstiele mit 2-10, oft stark gekrümmten, bis 2-4 mm langen Stacheln
- Kronblätter rundlich elliptisch
- Fruchtknoten dichthaarig