

## **Rubus uncinatus P.J. MÜLL.** = **Rubus pseud(o)infestus H. E Weber** **Falsche Feindliche Brombeere**

### **Bestimmungsrelevante Merkmale:**

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> flachbogig, stumpfkantig rundlich</li> <li>- <b>Behaarung:</b> pro cm Seite mit 5-15 einfachen und büscheligen Härchen</li> <li>- <b>Stieldrüsen:</b> 5-15 pro cm Seite, 0,5-1(-2) mm lang, borstig</li> <li>- <b>Stacheln:</b> ungleich oder streckenweise fast gleichartig, die größeren meist zu 8-13 pro 5 cm, aus breiter Basis schlank, (fast) gerade, einzelne oft etwas gekrümmt, 5-7 mm lang, untermischt mit wenigen bis vielen kleineren Stachelchen und Stachelhöckern</li> </ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Blättchenanzahl: Blätter</b> 3-4- bis etwas fußförmig 5-zählig</li> <li>- <b>Behaarung:</b> oberseits schwach glänzend grün, mit 0(-5) Haaren pro cm<sup>2</sup>, unterseits grün, mit etwas schimmernden Haaren deutlich fühlbar bis weich behaart, ohne Sternfilz</li> <li>- <b>Endblättchen:</b> Stielchenlänge 26-33 % der Spreitenlänge, aus gestutztem oder abgerundetem, gelegentlich angedeutet herzförmigen Grund umgekehrt eiförmig mit etwas abgesetzter, 6-12 mm langer Spitze</li> <li>- <b>Serratur:</b> mit fein und scharf bespitzten Zähnen periodisch mit längeren, vereinzelt etwas auswärts gekrümmten Hauptzähnen, 2-3(-4) mm tief</li> <li>- <b>Seitenblättchen:</b> untere bei 5-zähligen Blättern bis 7 mm lang gestielt</li> <li>- <b>Blattstiel:</b> länger als die unteren Blättchen, mit 12-20 sichelig bis hakig gekrümmten Stacheln</li> </ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> schmal pyramidal, oben mit etwas doldentraubig verzweigten, meist 3-blütigen Ästen</li> <li>- <b>Blätter:</b> 1-3(-5) cm unter der Spitze beginnend</li> <li>- <b>Achse:</b> mäßig dicht behaart, mit vielen Stieldrüsen; größere Stacheln zu 8-15 pro 5 cm, ungleich, doch deutlich von den übrigen Emergenzen abgesetzt, geneigt, überwiegend leicht gekrümmt, 4-6 mm lang; außerdem in schwankender Zahl kleinere Stacheln in Übergängen zu den (drüsigen) Borsten</li> <li>- <b>Blütenstiele:</b> 10-15(-20) mm lang, kurz filzig-wirrhaarig, mit vielen (&gt; 30) zarten, rötlichen Stieldrüsen und mit fast geraden bis schwach gekrümmten, derben, gelblichen, (1-)2-2,5 mm langen Stacheln</li> <li>- <b>Kelch:</b> graugrün, fein stieldrüsiger und mit gelblichen Stachelchen, zuletzt zurückgeschlagen</li> <li>- <b>Kronblätter:</b> weiß bis angedeutet rosa, schmal umgekehrt eiförmig, vorn meist tief eingekerbt</li> <li>- <b>Staubblätter:</b> etwa so hoch wie die grünlichen Griffel; Antheren kahl</li> <li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl oder mit vereinzelt Härchen</li> </ul>

**Kurzcharakteristik:** Charakteristisch für die Art sind ihre ungleichen, recht derben Stacheln, die streckenweise auf dem Schössling gelegentlich auch mehr gleichartig entwickelt sein können.

**Ähnliche Taxa:** *Rubus infestus*

**Ökologie und Soziologie:** Auf mäßig nährstoffreichen Böden auf Lichtungen und an Waldrändern. Bislang in Höhenlagen zwischen 150 m und 730 m beobachtet.

**Verbreitung:** Regionalsippe, nachgewiesen in Baden-Württemberg vom Rand des Rheingrabens bei Offenburg durch den Schwarzwald bis ins Neckargebiet bei Wendelsheim nahe Rottenburg. Gebietsweise eine der häufigsten Arten.